

Guía práctica de vacunación

Para niños, niñas,
adolescentes y adultos.



Esquema de vacunación

	BEBES						NIÑOS		ADULTOS		
	0	2	4	6	12	15	21	5	11	45	65
BCG											
Pentavalente *(a)											
Hexavalente **(b)											
(VPI) Polio											
(SRP) Sarampión, Rubeola, Paperas *(c)											
Varicela											
(Neumo 13) Neumococo											
Hepatitis A											
(DPT) Triple bacteriana											
(dpaT) Triple bacteriana acelular											
(dT) Doble bacteriana *(d)											
(HPV) Virus Papiloma Humano *(e)											
Meningococo B *(f)											
Meningococo ACWXY *(g)											
	EMBARAZO/PUERPERIO						PERSONAL DE SALUD				
Gripe *(h)	Embarazo entre las 32 y las 36, 6 semanas edad gestacional						En contacto con niños < 1 año				
VRS (Virus respiratorio sincitial) *(i)	En cada embarazo y para cuidadores *(f)						En contacto con niños < 1 año				
dpaT	En cada embarazo y para cuidadores *(f)						En contacto con niños < 1 año				
Hepatitis B	En cada embarazo y para cuidadores *(f)						En contacto con niños < 1 año				
Vacuna COVID - 19 a partir de los 5 años, según indicaciones del MSP (https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/esquema-vacunacion-contra-covid-19)											

Existen otras vacunas y/o indicaciones de vacunas para personas en situaciones especiales, por enfermedades, exposición laboral o viajes, que tienen recomendaciones específicas. Consultar con el médico tratante. Los inmigrantes que llegan al país deben adecuar sus vacunas al Certificado Esquema de Vacunación (CEV) vigente.

*(a) DPT: Difteria, Pertussis (tos convulsa), Tétano; HB: hepatitis B; Hib Haemophilus influenzae tipo b.

*(b) Hexavalente Difteria, Pertussis (tos convulsa), Tétanos; HB: hepatitis B; Hib Haemophilus influenzae tipo b; Polio (A partir del 1ero Julio en lactantes que inician vacunación).

*(c) Las personas nacidas después del año 1967 que no puedan certificar 2 dosis de vacunas SRP deben iniciar o completar el esquema de vacunación.

*(d) Régimen de 2 dosis (separadas de 6 meses) entre los 11-26 años, varones y mujeres, sin orden médica.

*(e) Régimen de 2 dosis (separadas de 6 meses) entre los 11-26 años, varones y mujeres, sin orden médica.

*(f) Lactantes que cumplen 2 meses después del 1 de Julio 2025.

*(g) Lactantes que cumplen 12 meses después del 1 de Julio 2025 y adolescentes que cumplen 11 años después del 1 de Julio 2025.

*(h) Se administra de manera anual, según grupo de riesgo recomendado por el MSP. En la edad pediátrica, es recomendada entre los 6 meses y 5 años, independientemente de comorbilidades.

*(h) Es recomendada en embarazadas en cada embarazo, luego de la semana 20 de gestación, preferentemente entre la semana 28 y 36. En caso de no haber sido vacunada durante el embarazo, pueden vacunarse durante el puerperio.

La vacunación de las personas embarazadas no requiere receta médica. Se aconseja administrar a familiares y cuidadores en contacto con recién nacido.

*(i) Personas embarazadas entre las 32 y 36, 6 semanas de edad de gestación.

Durante el primer año de vida

Nombre de la vacuna	Enfermedades que cubre	Edad de administración	Administración
BCG	Tuberculosis	Al nacer	Es administrada por una vacunadora del Hospital Británico que concurre al servicio hospitalario. Intradérmica (en el deltoides)
Pentavalente	Tétanos, difteria, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, osteoartritis, neumonía) y hepatitis B	2, 4, 6 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
(VPI) Polio	Poliomielitis	2, 4, 6 meses y 5 años	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
(NEUMO 13) Neumococo	Neumonía, meningitis, bacteriemia	2, 4 y 12 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)

A partir de Julio 2025

Meningococo B	Meningitis Sepsis Purpura fulminante	2, 4 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
Meningococo ACWXY	Meningitis Sepsis Purpura fulminante	12 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
Hexavalente	Tétanos, difteria, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, osteoartritis, neumonía), hepatitis B y polio	2, 4, 6 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)

De los 12 a los 21 meses

Nombre de la vacuna	Enfermedades que cubre	Edad de administración	Administración
(SRP) Sarampión, Rubéola, Paperas	Sarampión, rubéola y paperas	12 y 15 meses	Subcutánea (en el deltoides)
Varicela	Varicela	12 meses y 5 años	Subcutánea (en el deltoides)
Hepatitis A	Hepatitis A	15 y 21 meses	Intramuscular (en el deltoides)
Pentavalente	Tétanos, difteria, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, osteoartritis, neumonía) y hepatitis B	2, 4, 6 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)

A partir de Julio 2025

Meningococo B	Meningitis Sepsis Purpura fulminante	2, 4 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
Meningococo ACWXY	Meningitis Sepsis Purpura fulminante	12 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
Hexavalente	Tétanos, difteria, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, osteoartritis, neumonia), hepatitis B y polio	2, 4, 6 y 15 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
(NEUMO 13) Neumococo	Neumonia, meningitis, bacteriemia	2, 4 y 12 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)

A los 5 años

Nombre de la vacuna	Enfermedades que cubre	Edad de administración	Administración
(DPT) Triple bacteriana	Difteria, pertusis y tétanos	5 años	Intramuscular (en el deltoides)
Varicela	Varicela	12 meses y 5 años	Subcutánea (en el deltoides)
(VPI) Polio	Poliomielitis	2, 4, 6 meses y 5 años	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)

A los 11 años

Nombre de la vacuna	Enfermedades que cubre	Edad de administración	Administración
(dpa T) Triple bacteriana acelular	Difteria, pertusis y tétanos	11 años	Intramuscular (en el deltoides)
HPV	Virus del Papiloma Humano	11 a 26 años mujeres y varones 2 dosis	Intramuscular (en el deltoides)

A partir de Julio 2025

Meningococo ACWXY	Meningitis Sepsis Purpura fulminante	12 meses	Intramuscular (cara antero lateral del muslo)
----------------------	--	----------	--

A los 45 y 65 años

Nombre de la vacuna	Enfermedades que cubre	Edad de administración	Administración
(dT) Doble bacteriana	Difteria y Tetano	45 y 65 años	Intramuscular (en el deltoides)

Reacciones generales

Durante el primer año

En las 48 horas que siguen a la vacunación el niño puede tener principalmente fiebre, decaimiento y disminución del apetito. Esta reacción es atribuible a la vacuna y no debe alarmar a los padres. Una vez superado este tiempo, cualquier reacción febril no debe atribuirse a la misma, por lo que es imprescindible consultar al médico.

A partir del primer año

A los 7 o 10 días de administrada la vacuna puede aparecer erupción y/o fiebre.

A partir de los 5 años

En las horas siguientes a la vacunación el niño puede presentar fiebre. Luego de 10 días puede presentar erupción generalizada leve y/o fiebre.

A partir de los 12 años

En las 48 horas que siguen a la vacunación el niño puede presentar fiebre y decaimiento.

Reacciones locales

Durante el primer año

La zona donde se administró la vacuna puede inflamarse (enrojecimiento, dolor, hinchazón local). Estos signos son reacciones propias de la vacuna y retroceden solos, luego que el dolor y la hinchazón desaparecen. Durante un tiempo, puede persistir una pequeña dureza, por lo general, del tamaño de un garbanzo. Esto se debe a una sustancia que contiene la vacuna, que favorece la lenta absorción de la misma a fin de que la defensa proporcionada al organismo sea mayor en estas condiciones.

A partir del primer año

La zona donde se administró la vacuna puede encontrarse inflamada (enrojecimiento, dolor y edema local).

A partir de los 5 años

La zona donde se administró la vacuna puede inflamarse (enrojecimiento, dolor y edema local)

¡Protegerse a tiempo!

Para mantenernos sanos, desde niños debemos ser vacunados. Cada inoculación nos inmuniza contra ciertas enfermedades, evitando o disminuyendo las probabilidades de que podamos adquirirlas.

Para estar protegidos, los niños necesitan especialmente recibir cada dosis de cada vacuna en el momento apropiado.

Es importante sentirnos seguros a la hora de vacunarlos y transmitirles la importancia de la vacunación.

Hemos desarrollado este material de consulta permanente para informar lo necesario sobre cada vacuna. En caso de dudas, consúltenos. ¡Estamos para ayudarle!

Cuidados especiales para todo niño que ha sido vacunado

- La alimentación y baño se harán en forma habitual.
- Si el niño tiene fiebre se darán los antitérmicos recetados habitualmente por el pediatra tratante.
- Si en la zona de inyección presentara enrojecimiento, calor o inflamación en las primeras 24 horas, se podrá aplicar frío local discreto (bolsa fría, no hielo).
- En caso de erupción muy intensa se deberá consultar con un pediatra.



CENTRO DE VACUNACIÓN

Horarios de vacunación

Lunes a Viernes, de 8 a 19 hs.

Sábado, de 8 a 12 hs.

Contacto con vacunatorio

T. 2487 1020 int. 2740

Miranda 2671 esquina Bauzá

Av. Italia 2420 · Montevideo, Uruguay

www.hospitalbritanico.org.uy

